

Hoe komt de dierenarts tot DE DIAGNOSE EPILEPSIE BIJ UW HOND?

De meeste honden met epilepsie hebben **primaire epilepsie**³. Op alle andere vlakken zien deze honden er perfect gezond uit.

Primaire epilepsie kan voorkomen bij alle honden en op elke leeftijd, maar het komt vaker voor bij jonge rashonden. De meeste honden hebben een eerste aanval wanneer ze **tussen de 1 en de 5 jaar oud** zijn².

Het is mogelijk dat uw dierenarts reeds tot de diagnose 'epilepsie' komt op basis van de medische voorgeschiedenis, een medisch onderzoek en een standaard bloedonderzoek. In sommige gevallen zal uw dierenarts u aanraden om **bijkomende onderzoeken** te laten uitvoeren om zo de diagnose te bevestigen.

Behandeling van epilepsie

Elke hond is anders en de aard en ernst van de epilepsie kan verschillen. Uw dierenarts kan u vertellen hoe u deze aandoening het beste onder controle kan houden. Bij het geven van medicatie zijn vooral de volgende zaken erg belangrijk:

- Geef de medicatie **dagelijks** en op **regelmatige tijdstippen**.
- **Stop de medicatie nooit** zonder uw dierenarts te raadplegen.
- Ga **regelmatig op controle** bij uw dierenarts zodat hij/zij de gezondheidstoestand van uw hond kan evalueren en zo nodig de behandeling aanpassen.



Epilepsie hoeft niet tussen U EN UW HOND te komen

Er zijn 1000 redenen waarom u van uw hond houdt. **Laat epilepsie u daar geen enkele van ontnemen.** Met de juiste behandeling kan uw hond weer gelukkig zijn en kan u verder genieten van zijn fijne gezelschap.



Reden 125: hij stopt zijn neus graag in je zaken.

Wil u meer leren over epilepsie bij honden, surf dan naar www.epilepsie-hond.be of praat erover met uw dierenarts.

Referenties:

1. Berendt M. Epilepsy. In: Braund KG, ed. *Clinical Neurology In Small Animals—Localization, Diagnosis, and Treatment*. Ithaca, NY: International Veterinary Information Service; 2004.
2. Podell M. Seizures. In: Birchard SJ, Sherding RG, eds. *Saunders Manual of Small Animal Practice*, 3rd ed. St. Louis, MO: Saunders/Elsevier; 2006:1277–1293.
3. Thomas W. Seizures and narcolepsy. In: Dewey CW, ed. *A Practical Guide to Canine and Feline Neurology*. Ames, IA: Wiley-Blackwell; 2008:237–255.



KOM MEER TE WETEN OVER EPILEPSIE BIJ UW HOND

en geniet van een gelukkig
leven samen



Reden 75: ik heb geen wekker nodig.

Er bestaan 1000 redenen om van
uw hond te houden.

Ze zijn allemaal even belangrijk!

Een publicatie van



Met een beetje kennis over epilepsie **KAN U MET VERTROUWEN DE TOEKOMST AAN**

Net als bij mensen komt epilepsie bij honden vrij vaak voor: tot 5 honden op 100 kunnen epilepsie hebben¹. Gelukkig bestaan er goede behandelingen voor deze aandoening.

We spreken pas van epilepsie als er zich meerdere aanvallen voordoen. Deze aanvallen zijn het gevolg van een overmatige elektrische activiteit in de hersenen².



Epilepsie kan in grote lijnen worden onderverdeeld in 2 categorieën:

Primaire epilepsie

Er kan geen onderliggende oorzaak voor de aanvallen worden gevonden.

Secundaire epilepsie

Er is een medisch aantoonbare oorzaak voor de aanvallen (bv. infecties, tumoren, hoofdletsels, vergiftigingen, ...).

Epileptische aanvallen komen in veel verschillende vormen voor. In milde gevallen manifesteert een aanval zich bijvoorbeeld enkel door een licht trillen van de lip van de hond. Bij hevige aanvallen daarentegen kan een hond op de grond vallen en wilde trapbewegingen maken met zijn poten. Als een hond eenmaal een aanval heeft gehad kan het dagen, weken of zelfs maanden duren voordat hij weer een nieuwe aanval krijgt. In sommige gevallen krijgt de hond nooit meer een aanval.

Meestal is epilepsie een levenslange aandoening. U moet de moed echter niet laten zakken! Door nauw samen te werken met uw dierenarts kan u de aanvallen onder controle houden en verder genieten van het gezelschap van uw hond.

Weet wat u kunt verwachten **VÓÓR, TIJDENS EN NA** een aanval

Hoewel alle aanvallen verschillend zijn, kunnen we meestal de 3 volgende fasen onderscheiden:

► FASE 1

Gedragsveranderingen bij uw hond voorafgaand aan de aanval

Vóór de aanval merkt u misschien veranderingen op in uw hond zijn/haar:

- **Bewegingen:** zoals heen en weer lopen of likken van de lippen
- **Lichaamsfuncties:** zoals kwijlen of plassen
- **Gemoedsgesteldheid:** zoals janken, blaffen of verstoppen (onrust)

► FASE 2

De aanval

Meestal begint een aanval met een verstijving van de spieren. Vervolgens kan uw hond op zijn/haar zij vallen met uitgestrekte poten en een opgeheven kop. Mogelijks gaat dit gepaard met trappende bewegingen van de poten ('fietsen'). De meeste honden ademen zwaarder en sneller. Ze kunnen ook geluiden beginnen maken of spontaan plassen/zich ontlasten.

► FASE 3

Veranderingen bij uw hond na de aanval

Als de aanval voorbij is kan uw hond een tijdje bewegingloos op de grond blijven liggen voordat hij/zij weer probeert op te staan. De meeste honden vertonen ook gedragsveranderingen die minuten tot dagen kunnen duren, zoals bijvoorbeeld:

- Desoriëntatie en wankelend stappen
- Overmatige honger en dorst
- Ontregelde darm- en/of blaasactiviteit

WEES GOED VOORBEREID: Leer wat u kunt doen als uw hond een aanval heeft

Primaire epilepsie is niet te genezen. Zelfs als uw hond op medicatie staat, kan hij/zij af en toe nog een aanval hebben. Blijf rustig en volg de onderstaande aanwijzingen op. Op deze manier kan u uw hond het beste helpen. Neem na een aanval contact op met uw dierenarts indien nodig.

Zorg ervoor dat uw hond zich niet kan verwonden.

Haal voorwerpen weg waar uw hond tegenaan kan botsen (tafels of stoelen, maar ook kabels waar hij/zij in verstrikt kan raken). Probeer NIET de kop van uw hond vast te houden of zijn/haar tong uit de muil te halen. Honden slikken hun tong niet in, maar kunnen u wel per ongeluk bijten.

Verwijder "zintuiglijke prikkels".

Creëer een donkere en stille omgeving door de televisie uit te zetten, de gordijnen te sluiten, de lichten uit te doen en, indien mogelijk, andere dieren of kinderen uit de kamer te halen.

Registreer de tijdsduur van de aanval.

Een aanval duurt meestal een paar seconden tot enkele minuten. Neem onmiddellijk contact op met uw dierenarts indien:

- De aanval langer duurt dan 5 minuten.
- Uw hond meerdere aanvallen heeft gehad op één dag.

Houd een epilepsie dagboek bij en leg de aanvallen vast op film.

Door een dagboek bij te houden en de aanvallen te filmen kan u uw dierenarts erg waardevolle informatie bezorgen bij uw volgende bezoek. Op basis van deze informatie kan uw dierenarts de meest geschikte behandeling kiezen voor uw hond.